

令和5年度の日本脳炎第2期定期予防接種に係る個別通知は、国からの指示をもとに、次の方へ送付します。

- ① 9歳に達する方（8歳11ヶ月のとき：平成28年度から送付を開始）
- ② 18歳となる方（平成17年4月2日～18年4月1日生まれの方）

さいたま市
令和5年4月版

日本脳炎第2期定期予防接種のご案内

接種の前にこのご案内をよくお読みいただき、母子健康手帳等で接種歴をご確認の上、お子さんの体調の良い時に接種を受けてください。

1 対象者・接種方法

(1) 接種対象者 接種日時点で、次の2つの条件を満たす方

- ① さいたま市に住民登録のある方
- ② 対象年齢の方

(2) 対象年齢 9歳～13歳未満（標準的な接種年齢：9歳）

※平成15年4月2日～平成19年4月1日生まれ（特例措置対象者）
の方の接種方法は、3ページをご覧ください

(3) 接種場所 さいたま市定期予防接種実施医療機関

※市内の実施医療機関以外で接種を希望される場合は、事前に各区役所保健センターへご相談ください

(4) 接種費用 無料

(5) 必要な物 ①予診票 ②母子健康手帳 ③健康保険証 ④子育て支援医療費受給資格証、心身障害者医療費受給資格証、またはひとり親家庭等医療費受給資格証 ⑤お子さんがさいたま市民であることを確認できる書類（健康保険証、個人番号カード等）

◆◆◆ 詳しくは、下記各区役所保健センターへお問合せください ◆◆◆

西 区保健センター	TEL 620-2700	FAX 620-2769	桜 区保健センター	TEL 856-6200	FAX 856-6279
北 区保健センター	TEL 669-6100	FAX 669-6169	浦和区保健センター	TEL 824-3971	FAX 825-7405
大宮区保健センター	TEL 646-3100	FAX 646-3169	南 区保健センター	TEL 844-7200	FAX 844-7279
見沼区保健センター	TEL 681-6100	FAX 681-6169	緑 区保健センター	TEL 712-1200	FAX 712-1279
中央区保健センター	TEL 840-6111	FAX 840-6115	岩槻区保健センター	TEL 790-0222	FAX 790-0259

2 日本脳炎の症状

日本脳炎は、日本脳炎ウイルスの感染によって起こる中枢神経（脳や脊髄など）の疾患です。ブタなどの動物の体内でウイルスが増殖した後、その動物を刺したコガタアカイエカ（水田等に発生する蚊の一種）が人を刺すことによって感染します。そのため患者から周囲の人への感染はありません。

感染しても症状が現れない（不顕性感染）場合がほとんどです（過去には、感染者のうち 0.1%～1% が発病すると報告されています）。症状が出る場合には、6～16 日間の潜伏期間の後に、数日間の高熱、頭痛、嘔吐などで発病し、これらに引き続き急激に、意識障害（意識がなくなること）、けいれん等の中枢神経系障害（脳の障害）を生じます。脳炎を発症した場合 20～40% が死に至るといわれています。

日本脳炎は日本以外にも、東アジアから東南アジア、南アジアなどの地域で広く発生しています。国内での発生状況は、予防接種により著しく患者が減り、平成 4 年以降の報告患者は毎年ほぼ 10 名以下となっています。そのうち大部分は、九州・沖縄地方及び中国・四国地方で発生しており、北海道、東北地方においては発生していません。関東、甲信越地方においては、まれですが発生が確認されてあります。

3 日本脳炎ワクチンの効果と副反応

日本脳炎の予防接種は、第 1 期の初回接種 2 回と概ね 1 年後の追加接種 1 回の計 3 回の接種をもって基礎免疫の完了と考えます。さらに第 2 期として 1 回接種し、計 4 回接種します。

ただし、予防接種により、軽い副反応がみられることがあります。また、極めてまれですが、重い副反応が起こることがあります。日本脳炎の予防接種後にみられる副反応は、次のとおりです。

- 局所の反応：紅斑、疼痛、腫脹、かゆみなど
- 全身の反応：発疹、発熱、じんましん、紅斑、頭痛、咳嗽、鼻水、咽喉頭痛、咽頭発赤、嘔吐、下痢、食欲不振、腹痛など

※まれに生じる重い副反応として、ショック、アナフィラキシー様症状（血管浮腫、全身にひどいじんましん、呼吸困難など）、急性散在性脳脊髄炎、血小板減少性紫斑病、脳炎・脳症、けいれんなどを起こしたとの報告があります。

【女性への注意事項】

妊娠中の接種に関する安全性が確立していないため、妊娠している方又はその可能性がある方は、原則接種できませんが、予防接種の必要性及び効果が母体への影響、並びに危険性を上回ると接種医が判断した場合にのみ接種することができます。接種の際は、接種を受ける医師にご相談のうえ、適当な時期に接種してください。

4 【参考】積極的勧奨の再開について

日本脳炎の定期予防接種については、マウス脳由来の日本脳炎ワクチン接種後に急性散在性脳脊髄炎（ADEM）を発症した事例が報告されたことから、平成 17 年 5 月以降、厚生労働省から積極的な接種勧奨を差し控えることとされました。

その後、平成 21 年 2 月に新たに乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンが開発され、厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会の下に設置された、日本脳炎に関する小委員会において専門家が検討した結果を踏まえ、平成 22 年 4 月に積極的勧奨が再開しました。また、特例措置として、平成 7 年 4 月 2 日～平成 19 年 4 月 1 日生まれの方は 20 歳未満の間に必要な接種が可能となりました。特例措置対象の方については、国において毎年、年齢を定めて、順次積極的な勧奨を行っています（対象者・接種方法は 3 ページを参照）


【特例措置】(平成 15 年 4 月 2 日～平成 19 年 4 月 1 日生まれで 20 歳未満の方)

平成 15 年 4 月 2 日～平成 19 年 4 月 1 日生まれの方で、第 1 期の【3 回接種】および第 2 期の【1 回接種】が完了していない場合、不足分を接種する機会が「特例措置」として設けられています。現在、国からの指示をもとに順次通知を行っていますが、早期に接種をご希望の方は、各区役所保健センターで予診票を受領の上、実施医療機関で接種を進めてください。その際は母子健康手帳を必ずご持参ください。

(1) 平成 23 年 5 月 19 日までに、接種を受け始める場合

第 1 期：20 歳未満までに、6 日以上あけて **不足回数分** を接種

第 2 期：20 歳未満までに、第 1 期終了から 6 日以上あけて **1 回** 接種



(2) 平成 23 年 5 月 19 日までに、全く接種を受けていない場合

第 1 期：20 歳未満までに、6 日以上あけて **2 回** 接種。その後、6 カ月以上あけて **1 回** 接種

第 2 期：20 歳未満までに、第 1 期終了から 6 日以上あけて **1 回** 接種



5 定期予防接種による健康被害救済制度

(1) 定期予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因（予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等）によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。

(2) 給付の内容は、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料となっており、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。

※給付申請の必要が生じた場合には、予防接種を受けた医療機関へご相談ください。

【参考】 特別な事情により定期予防接種の機会を逃した場合について

接種対象年齢の間、「長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった」「臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた」等の特別な事情があり、やむを得ず接種を受けることができなかつた場合は、その特別な事情がなくなつてから原則 2 年以内であれば、公費で定期予防接種を受けることができます。

この制度の利用希望がある場合は、事前に各区役所保健センター等へご相談ください。

◆注意事項

- ① 医療機関の診療時間内に事前予約をしてください。
- ② 医療機関のワクチンの在庫状況や休診日等により、希望どおりに接種を受けられないことがあります。事前に医療機関へ確認をしてください。
- ③ 接種当日は体調を確認し、平熱より高い・機嫌が悪い・風邪症状がある等の場合は延期をお勧めします。
なお、以下の項目に該当する方もご注意ください。
 - ・4週間以内に他の予防接種を受けている。
 - ・生まれてから今までに特別な病気にかかり、医師の診察を受けている。
 - ・ひどいアレルギーがある。
 - ・けいれんを起こしたことがある。
 - ・過去に免疫不全の診断を受けている及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる。
 - ・下記の例の病気が治癒してから2週間～1ヶ月経過していない、もしくは潜伏期間と考えられる場合は医師の判断により接種を見合わせる場合があります。
〔例〕○手足口病 ○伝染性紅斑（りんご病）○水痘（水ぼうそう）○麻疹（はしか）
○風疹（三日ばしか）○流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）等
 - ・医師の診察及び投薬を受けている方は、接種可能か確認されることをお勧めします。
- ④ 医療機関へは「予診票」、「母子健康手帳」、「健康保険証」、「子育て支援医療費受給資格証、心身障害者医療費受給資格証、またはひとり親家庭等医療費受給資格証」を必ず持参してください。
- ⑤ 接種後30分はお子さんの様子をよく確認してください。
- ⑥ 接種後、接種部位のひどい腫れ・高熱・ひきつけ等の症状がある場合は、医療機関で診察を受けてください。
- ⑦ 接種日時点でさいたま市に住民登録のない方が接種した場合、接種費用は原則自己負担となります。後日、判明した場合は、接種医療機関にお支払いいただきます。

◆予防接種を受けることができない方

- 1 明らかに発熱のある方
- 2 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方
- 3 その日に受ける予防接種によって、または予防接種の接種液に含まれる成分で、アナフィラキシー*を起こしたことのある方
※アナフィラキシーとは、通常接種後約30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことです。発汗、顔が急に腫れる、全身にひどいじんましんが出るほか、吐き気、嘔吐、声が出にくい、息が苦しいなどの症状に続きショック状態になるような激しい全身反応のことです。
- 4 その他、医師が不適当な状態と判断した場合
※上の1～3にあてはまらなくても、医師が接種不適当と判断した場合は接種できません。

◆他の予防接種との間隔

他の予防接種との間隔は下表のとおりです。

生ワクチン [注射]	●麻疹・風疹混合 ●麻疹 ●風疹 ●BCG ●水痘（水ぼうそう） △おたふくかぜ	27日以上あける	生ワクチン [注射]
---------------	---	----------	---------------

●：定期予防接種 △：任意予防接種（有料）

*ロタウイルスワクチンは生ワクチンですが、注射ではなく、経口（口から飲む）ワクチン接種です。

*同じワクチンを複数回接種する場合は、各ワクチンの接種間隔を守ってください。

※対象年齢・接種間隔の解釈、新型コロナワイルスワクチン
との接種間隔については、さいたま市HPをご覧ください。

